

КАТАЛОГ ЖИВЫХ ТРОПИЧЕСКИХ БАБОЧЕК



ЗДЕСЬ ВЫ
МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПОДАРОК!

Бабочка Attacus Atlas (Аттакус)

Цена: 2000руб.



Вид сверху

Размах крыльев
240—260 мм

Attacus Atlas – гигантская ночная бабочка, размах крыльев превышает 25 см, одна из самых крупных в мире. Бабочка имеет необычный рисунок: на основном бархатно-коричневом фоне имеются розовые разводы и прозрачные окошки треугольной формы. Самка и самец заметно отличаются по размеру и форме крыльев. Самец меньше (размах 18-20 см) и концы верхних крыльев имеют заточенную форму, самка имеет более крупные округлые крылья и размах 24-26 см.


Также самец имеет более широкие и крупные усики, чем у самки. Даже в стадии куколки, если приглядеться, разница в размерах усиков хорошо видна и это один из немногих видов, у которых на стадии куколки можно отличить самку от самца. Род Attacus имеет ареал обитания от Восточной Индии до Новой Гвинеи. Рацион гусениц атласа достаточно велик, поэтому полный цикл бабочки довольно просто воспроизвести и в домашних условиях. Правда гусеницы на последних стадиях развития невероятно прожорливы и могут съесть в 100 раз больше своего веса за день. Длина гусениц на последней стадии достигает 10 см.

Гусеница Attacus Atlas перед тем как окуклиться делает вокруг себя коричневый кокон. В Индии атласов разводят специально для изготовления из этих коконов шерстистого фаягового шелка, который отличается коричневым цветом и особой крепостью. Кокон в природе охраняет куколку от паразитов и хищников, а также является инструментом естественного отбора. Только сильные и живучие бабочки смогут выбраться из кокона наружу, слабые не преодолеют этого первого испытания. Стадия куколки теплого периода обычно длится 3 недели, зимнего может впасть в диапаузу (спячку). Диапазирующая куколка может находиться в таком состоянии до года, пока не станет тепло. Родственники атласа Attacus Lorquini и Attacus Caesar не диапазируют не имеют такого механизма защиты от холодов, но хороши для парков бабочек, т.к. не надо ждать пол года, чтобы увидеть одну из самых крупных бабочек мира. Эта бабочка как и многие сатурнии не имеют хоботка и питаются лишь запасами которые припасла бабочка, когда была гусеницей. Продолжительность жизни Attacus Atlas около недели. Для подарков эта бабочка практически не используется, т.к. в солнечное время она практически не летает (это же ночная бабочка), да и она вполне может напугать одаряемого, т.к. она мохнатая, коричневая и огромная как летучая мышь.


В коллекциях Attacus atlas встречается часто. Многие экземпляры выведены из куколок на фермах и поэтому сохранили свою первозданную красоту. У бабочек, родившихся в естественных местах обитания, крылья часто повреждаются уже в первые часы лёта.

Бабочка *Troides Rhadamantus* (Александрия)

Цена: 1200руб.



Вид сверху



Вид снизу

Triodes rhadamantus — русское название Птицекрылка золотистая — У этой бабочки контрастное и в то же время гармоничное сочетание яркого золотисто-желтого цвета с черным. Самка от Самца немного отличается. Как правило самцы немного мельче 12-13 см, их нижние крылья практически полностью желтые, а вот верхние полностью черные. Самки крупные, 14-16 см, их нижние крылья имеют черную окантовку вокруг желтого пятна, а верхние крылья имеют ярко-выраженные белые разводы. Брюшко бабочки по бокам ярко желтое, в то время как у большинства бабочек брюшко темное. Ареал обитания Птицекрылки — юговосточная Азия (Филиппины, Индонезия, Папуа новая Гвинея). Продолжительность жизни 10-12 дней.


Этой бабочке свойственен быстрый стремительный прямолинейный полет, однако перед полетом бабочке нужно размять крылья, поэтому ее любят снимать видеооператоры, бабочка сидит на месте но в то же время активно машет крыльями давая запечатлеть красивые кадры. Эта бабочка великолепно подходит для одиночных подарков, например в «живой открытке» или валетинке. Куколка бабочки имеет долгий период созревания — около месяца.

Размах крыльев
140—160 мм




Бабочка *Idea Leuconoe* (Аврора)

Цена: 1000руб.



Вид сверху

Idea leuconoe – Другое название этой бабочки «рисовая бумага». Ее так прозвали, потому что ее полет похож на падающий кусочек бумаги, такой же медленный и плавный, как в замедленной съемке. Яркая бабочка, белый полупрозрачный фон крыльев переплетен тонкими черными прожилками, узор у всех бабочек Идея неодинаковый если присмотреться, и, для каждой бабочки он свой, как отпечатки пальцев у человека. Размах крыльев этой бабочки достигает 12-15см. Эту бабочку очень любят молодожены, она очень хороша как для штучных живых открыток, так и для салютов из бабочек. *Idea leuconoe* – резидент всех выставок и садов бабочек, ее грациозный неспешный полет позволяет любоваться ей в полете долгое время. Гусеница бабочки питается тилофлорой. В стадии куколки бабочка находится 2 недели. Куколка *Idea leuconoe* имеет яркий желтый цвет, что сильно выделяет ее на фоне зелено-коричневых собратьев. Имаго Идея – долгожитель, эта бабочка может прожить 4-5недель при хорошей пище и подходящем климате. Ареал обитания ее находится в Южной Азии, Малайзии, на Филиппинах.



Вид снизу


Размах крыльев
120—150 мм




Бабочка *Papilio Rumanzovia* (Барселона)

Цена: 1000руб.

Вид сверху



Вид снизу



Papilio rumanzovia – русское название Парусник Румянцева или Красный Мормон – Эту бабочку нельзя перепутать ни с одной другой. Ее красные пятна на нижних крыльях контрастно выделяются на бархатно черном основном фоне. Самки и самцы имеют различную окраску – ярко выраженный деморфизм. У самцов окраска всегда одинаковая и не такая богатая на красный цвет как у самок, красные пятна расположены на нижней стороне задних крыльев. У самок же красные полосы ил пятна присутствуют и на передних крыльях. Иногда самка имеет посередине задних крыльев ярко выраженное белое пятно – так называемая белая форма, наиболее востребованная у коллекционеров.

Такая контрастная и яркая окраска помогает этой бабочке избежать нападения хищников. Обитает эта бабочка в Юго-Восточной Азии: на Филиппинах, в Малайзии, Сингапуре, Таиланде. Размах крыльев *Papilio Rumanzovia* достигает 12-14см. Полет как и у многих парусников неспешный и размашистый, когда бабочка садится – ее крылья остаются расправлены, это дает возможность фотографам сделать красивые фотографии, бабочка как бы позирует показывая все свои крылья. Имаго *papilio rumanzovia* живет 7-10 дней. Питается Парусник Румянцева на различных видах Аристолохии. В стадии куколки бабочка находится 3 недели. Очень желанная и популярная бабочка для подарков как штучных так и массовых салютов из бабочек. Кстати названа бабочка в честь графа Николая Петровича Румянцева, который организовал экспедицию, в которой была открыт этот вид бабочек. В нашей компании эта бабочка доступна практически круглый год вне зависимости от сезона.

Размах крыльев
120—140 мм



Бабочка *Papilio Palinurus* (Эльф)

Цена: 1100руб.



Вид сверху



Вид снизу

Размах крыльев
80—100 мм

Papilio palinurus – русское название Парусник Палинур, иногда эту бабочку называют бабочка-Павлин. Размах крыльев до 8 — 10 см. Нижняя сторона крыльев черного цвета, а вот верхняя щедро украшена изумрудными полосами покрывающими и переднее и заднее крыло. На задних крыльях *Papilio palinurus* имеются хвостики-капельки, придающие бабочке экзотическую форму.

Зелено-черную бабочку хищникам очень трудно разглядеть в листве деревьев, поэтому окраска Палинура не только природная красота, но и надежная защита от врагов. Обитает *Papilio palinurus*.

В Юго-восточной Азии: на Филиппинах, в Малайзии, Сингапуре, Тайланде. Полет у этой бабочки стремительный и хаотичный. когда бабочка садится – ее крылья часто остаются расправлены, это дает возможность фотографам сделать красивые фотографии, бабочка как бы позирует показывая все свои крылья. Поэтому многие сады и выставки бабочек непременно содержат этот вид, чтобы показать своим посетителям. Имаго *papilio palinurus* живет 7-10 дней. Питается Парусник Палинур на citrusовых. В стадии куколки бабочка находится 3 недели. Очень активная и динамичная бабочка, поэтому великолепна для массовых салютов из бабочек.

Бабочка *Papilio lowii*


Цена: 1000руб.



Вид сверху

Papilio Lowi – Парусник Леви. Один из самых крупных азиатских парусников, его размах крыльев 11-14см. Самки существенно отличаются от самцов расцветкой.

Окрас самцов скудный – бархатно черные крылья с белесыми разводами на нижних крыльях. Самки имеют богатую расцветку. Верхние крылья светлые имеют светлорозовые пятнышки в области крепления крыльев к туловищу. Нижние крылья бывают от коричневого до светло бежевого цвета. У разных подвигов *Papilio Lowi* и самцы и самки бывают с хвостиками, бывают без. Гусеницы развиваются на цитрусе (сем. рутовых). Стадия куколки у Парусника Леви занимает 3 недели. Продолжительность жизни имаго 6-7 дней. Парусник Леви желанный гость парков бабочек, т.к. практически всегда сидит с расправленными крылышками, выставляя напоказ всю свою красоту. *Papilio Lowi* отличный летун и отлично показывает себя в массовых фейерверках из бабочек. В штучных «живых открытках» популярностью пользуются более светлые самки Парусника Леви.



Вид снизу


Размах крыльев
110—140 мм




Бабочка Papilio Polites

Цена: 900руб.

- Могут вылупиться двух окрасок
- Размах крыльев 100—130 мм



Вид сверху



Papilio polytes – Парусник Полит. Ареал обитания — юго-восточная Азия, от Индии до Китая и Индонезии. Самцы очень отличаются от самок по окраске и форме крыльев. Самцы полностью черные с белой полосой на верхних и нижних крыльях, самки имеют красные пятнышки и иногда белые пятна на нижних крыльях. Также самки Политов имеют хвостики, которые придают бабочке более изящный грациозный облик. Размах крыльев *Papilio polytes* 8-10см. Гусеницы развиваются на citrusовых. Куколки очень умело мимикрируют и бывают ярко зеленые, бурые, серые с разводами – такую вряд ли заметишь среди листвы. В стадии куколки полит находится 2 недели. Продолжительность жизни имаго 5-7 дней. Эти бабочки очень активны и большую часть времени находятся в полёте в поисках любимого цветка или своей пары, и даже когда бабочка сидит, она как правило с раскрытыми крыльями, поэтому их очень любят организаторы парков бабочек.

Эта бабочка хороша для фейерверков из бабочек, для штучных заказов не пользуется особой популярностью. Самцы *Papilio polytes* очень похожи на филиппинскую бабочку *Papilio hipponous*, однако у последней кроме черно-белой окраски имеются хвостики, которых у Политов самцов не бывает.

Бабочка Graphium Agamemnon (Лайм)

Цена: 900руб.

Вид сверху



Graphium Agamemnon —
Графиум Агамемнон — ее еще называют
зеленым треугольником. Небольшая, но
очень выразительная бабочка.


Размах крыльев
70—90 мм




Вид снизу

Бабочка *Pachliopta Kotzebuea*

Цена: 1100руб.



Вид сверху



Вид снизу

Pachliopta kotzebuea – парусник коцебу. Размах крыльев 7-8 см. Существует 5 подвидов данного вида, но отличительной чертой всех является наличие лишь черного и красного цвета. Из-за такой окраски ее также называют Пурпурной Розой. Красно-черное тело и крылья бабочки свидетельствуют о ядовитости бабочки, поэтому различные хищники не рискуют ею пообедать. Гусеницы питаются на растениях семейства кирказоновых. В стадии куколки бабочка находится около двух недель. Продолжительность жизни имаго 6-7 дней. Полет коцебу неспешный парящий, бабочка хорошо подходит для салютов. Для штучных заказов ее редко покупают, т.к. она мрачновата и невелика. Ареал обитания – Филиппины.

Размах крыльев
70—80 мм



Бабочка Papilio Memnon

Цена: 1000руб.



- Могут вылупиться двух окрасок
- Размах крыльев 100-130 мм

Семейство Papilionidae (Парусники, или Кавалеры) - типичные булавоусые, или дневные бабочки. От других представителей этой группы чешуекрылых их легко отличить по характерному признаку: внутренний край задних крыльев вырезан и не прилегает к брюшку. Кроме того, у преобладающего большинства видов задние крылья вытянуты в длинные "хвостики", что придает особую изящность общему контуру крыльев. Передние конечности развиты нормально. Семейство включает около 20 родов и 500 видов, распространенных почти по всему миру. Наибольшее разнообразие форм, к тому же наиболее крупных и ярких, встречается в тропических странах. Одни из самых красивых видов богато представлены в Индо-Малайской области и в Океании. Славятся своей красотой и южноамериканские Кавалеры, которые отличаются большим разнообразием окрасок. Здесь можно встретить самую различную расцветку крыльев — от ярко-оранжевой в сочетании с черным и желтым (*Papilio zagreus*) до бархатно-черной с красными и белыми пятнами (*Eurytides lysithous*). Особое место в семействе занимает род Настоящих кавалеров (*Papilio*): на его долю приходится около 40 % от общего числа видов, из них четыре вида встречаются в России



Бабочка *Danaus Crisippus*

Цена: 800руб.



Вид сверху


Danaus Chrysippus – Данаида Хризип. Размах крыльев 6-8см. Небольшая оранжевая бабочка. Верхние крылья более вытянутой формы, нижние – более округлые. Верхний край передних крыльев черный с белыми пятнышками. Нижние крылышки имеют черную окантовку с мелкими белыми пятнышками. Также белыми пятнышками покрыта грудка и лапки бабочки. На нижних крылышках самцы имеют 4 темных пятнышка, а самки 3. Ареал обитания *Danaus Chrysippus* довольно обширный. Египет, Сирия, Турция, Индия, Филиппины, Индонезия и Австралия.

В жарких тропиках бывает до 12 поколений в год, т.к у этого вида очень короткий цикл. Стадия куколки длится 7 дней, продолжительность жизни Имаго данаиды хризип 7-10 дней. Полет у бабочки хаотичный, бабочка довольно активна и стартует с места бросаясь резко в сторону. Поэтому *Danaus Chrysippus* великолепно подходит для массовых салютов из бабочек. Для штучных подарков с бабочками очень мелкая и не пользуется популярностью. Даная хризип будет украшением любой выставки или парка бабочек, так как бабочка яркая и долго на месте не сидит, постоянно летает в поисках пищи. В питании не разборчива и кушает все что жидкое и сладкое, будь то перезревшие фрукты или медовый раствор или просто капля росы.



Вид снизу

Размах крыльев
60—80 мм




Бабочка *Hypolimnus Bolina* (Лунная)

Цена: 600руб.



Вид сверху



Вид снизу

Размах крыльев
60—80 мм

Hypolimnus bolina – Гиполимнас Болина. Сверху крылья чёрные с более светлым внешним краем, у самцов есть белые пятна на крыльях, которые в лучах солнца приобретают фиолетовый отблеск. Снизу крылья имеют бурую окраску со светлыми пятнами и прожилками. Размах крыльев 6-8 см. Ареал обитания юговосточная Азия: Индия, Пакистан, Филиппины, Тайланд, также эти бабочки распространены и в Австралии. Гусеница чёрная с жёлтыми ветвящимися шипами; кормится на многих растениях, таких как портулак, горец, ипомея. Куколка светло-коричневая на ранней стадии и тёмно-бурая на конечной с характерными для всего рода *Hypolimnus* шипами.

Стадия куколки длится 10 дней. Продолжительность жизни имаго около 2-х недель. Бабочка отлично подходит для массовых фейерверков из бабочек, т.к. является отличным летуном и резко стартует с места. Имеет хаотичный характер полета. Для штучных подарков мелковата. В саду бабочек будет интересно понаблюдать за играми этих небольших бабочек, бабочка охотно позирует на камеру, переползая с места на место, чтобы в лучах солнца были видны сине-фиолетовые пятнышки на верхней стороне крыльев.


Бабочка *Cethosia Biblis*

Цена: 600руб.

Вид сверху




Вид снизу



Cethosia biblis – Цетозия Библис – очень щедро окрашенная бабочка. Сверху крылья бабочки имеют оранжево-красную предупреждающую окраску, снизу рисунок напоминает персидский ковер с множеством зигзагов точно арабские письмена. Поэтому бабочку и назвали библис, что означает «книга». Ареал ее обитания вся Южная Азия: Индонезия и Филиппины, Малайзия, Индия, Пакистан.

Гусеницы Цетозий питаются ядовитыми растениями семейства страстоцветов и поэтому ядовиты для большинства животных, взрослые имаго также ядовиты, их яркая бросающаяся в глаза окраска об этом навязчиво говорит «не стоит меня кушать». Размах крыльев *Cethosia biblis* 6-8 см. В стадии куколки бабочка находится 8-9 дней. Продолжительность жизни имаго 5-7 дней. Эта красивая яркая бабочка украсит любую выставку или сад бабочек. Отлично подходит для фейерверков из бабочек, т.к. хорошо летает. Характер полета беспорядочный. Эта бабочка нередко притворяется умершей, когда ее трогаешь руками, падает набок и замирает, однако как только бабочка почувствует что опасность миновала, довольно резко стартует и улетает прочь.



Размах крыльев
60—80 мм



Бабочка *Parthenos Sylvia*

Цена: 800руб.

Вид сверху



Вид снизу

Размах крыльев
70—90 мм

Parthenos Sylvia – Партенос Сильвия – еще иногда называют тигровой бабочкой, так как ее коричнево — бежевые полосы на теле и крыльях очень напоминают окрас тигра. Размах крыльев 7-9 см. Эта бабочка обитает во влажных тропических лесах Юго-Восточной Азии, от Индии до Малайзии и Новой Гвинеи. Некоторые учёные считают, что за миллионы лет эволюции бабочка скопировала внешность этого грозного хищника и использует её для отпугивания потенциальных врагов. Ведь и многие другие представители мира бабочек используют подобный приём, имитируя глаза птиц или головы змей на своих крыльях. Хотя тигриную окраску напоминает только Филиппинский подвид *Parthenos Sylvia Philippinensis*, а например индийский подвид *Parthenos Sylvia Violacea* имеет зеленый отлив, а малазийский *Parthenos Sylvia Lynceaus* – голубоватый. Гусеницы Сильвии питаются аденией (сем. пассифлоровых). Бабочки обычно обитают на опушках леса, где летают высоко среди деревьев. В стадии куколки бабочка находится 2 недели.

Партенос Сильвия является отличным летуном и великолепно подходит для хассовых запусках на праздниках. Продолжительность жизни *Parthenos Sylvia* около 2-х недель. В парках бабочек эта бабочка отлично улавливает запахи и охотно лакомится перезревшими забродившими фруктами.


Крылья Сильвии часто используют для создания украшений и бижутерии. Кулоны и сережки из крыльев Партенос придают агрессивный тигринный стиль своим хозяевам.




Бабочка Papilio Demoleus

Цена: 800руб.

Вид сверху



Вид снизу




Размах крыльев
80—100 мм

Papilio Demoleus – парусник демолей. Обитает на обширной территории Индонезии, Бирме, Китае, Филиппинах и Австралии. Гусеницы развиваются на цитрусовых, из-за этого эту бабочку прозвали парусником лимонным. Полет у бабочки стремительный. Великолепный летун плюс светлая броская окраска отлично позволяют себя проявить в фейерверке из бабочек. В стадии куколки находится 1,5 недели. Продолжительность жизни имаго 6-7 дней. Гусеницы и куколки этого вида великолепно мимикрируют под окружающую среду и бывают различной окраски коричнево-желтые, зеленые, серые в крапинку. Бабочка довольно яркая и активная, поэтому любима организаторами парков бабочек. По расцветке имаго парусника демолея очень похожа на своего африканского родственника Papilio demodocus, правда демолей немного меньше демодока и немного отличается рисунок на нижней стороне крыльев. Но неопытный глаз вряд ли заметит отличие.

Бабочка *Neobotoia Glaucippe*

Цена: 800руб.

Вид сверху



Neobotoia glaucippe – Гебомоя Главк. Размах крыльев в среднем 6-10см. Ареал обитания Индия, Пакистан, Малайзия, Филиппины. Малазийские подвиды как правило самые крупные — до 10 см и являются вообще самой крупной бабочкой семейства белянок, филиппинские подвиды – самые мелкие 6-7см. Самцы и самки отличаются окраской, самцы имеют ярко-оранжевые концы верхних крыльев, у самок присутствует черная окантовка вокруг оранжевых пятен а также темные пятна на нижних крыльях. У этих бабочек даже поведение у самцов и самок различается. Самки стараются не покидать тени деревьев в лесу, а самцы наоборот предпочитают открытые лужайки. Гусеницы *Neobotoia glaucippe* развиваются на каппарисе (семейство капперсовых). Куколки этого вида принимают цвет того места, на котором они окуклились и бывают желтого, зеленого или телесного цвета. В стадии куколки гебомоя находится 2 недели. Продолжительность жизни имаго 4-6дней. Одна из ярких бабочек, которую непременно хотят видеть молодожены в своем свадебном салюте из бабочек. Для садов и парков бабочек эта бабочка также интересна своей броской окраской.

Вид снизу



Размах крыльев
60—100 мм



Бабочка *Doleschallia Bisaltide*

(Осенний лист)

Цена: 600руб.

Вид сверху



Вид снизу




Бабочка - Осенний Лист (*Doleschallia bisaltide*, размах крыльев 6 - 8 см). Эта красавица в мире бабочек является общепризнанным Символом Находчивости! Рыжая бабочка, с труднопроизносимым научным названием *Doleschallia bisaltide*, которое вряд ли всколыхнет в вашей душе какие-либо воспоминания, хорошо известна своей удивительной способностью маскироваться под жухлые осенние листочки. Она была открыта еще в 1777 году, когда один из ученых-орнитологов, путешествуя по джунглям Малайзии, чуть не наступил на прелестное легкокрылое создание, отдыхавшее на слое опавшей листвы. Вспорхнув и закружив вокруг обескураженного человека, прелестная оранжевая бабочка тут же получила прозвище «Осенний лист», через некоторое время став одной из самых узнаваемых в мире.

Размах крыльев
60—80 мм

Обитают эти удивительные бабочки в тропических лесах Южной Азии, встречаются также в Индии и Австралии. Летают они по прямой траектории, отличаясь очень быстрой и сильной манерой передвижения. Предпочитают передвигаться поодиночке, облюбовывая небольшие поляны и карьеры вдоль лесных деревень. Бабочка с оранжевыми крыльями, в точности повторяющими форму листа (даже с небольшими закруглениями на кончиках, имитирующими черенок листа, а также ниточками, жилками, рельефным рисунком и пятнами, имитирующими плесень), часто присаживается на мокрые камни или песок, чтобы напиться влагой. Потревожив её, вы заметите, что через некоторое время *doleschallia bisaltide* вернется на это же место, устроится поудобнее и сложит крылышки, продемонстрировав внимательному наблюдателю своё искусство маскировки. В стадии куколки эта находчивая бабочка проводит двенадцать дней, а примерный срок её жизни составляет от 14 до 21 дня.

Бабочка Ideopsis Juventa


Цена: 600руб.



Вид сверху

Идеопсис Ювента (*Ideopsis juventa*). Размах крыльев 6-8 см. Обитает эта бабочка преимущественно на Филиппинах. Она относится к семейству Данаид, и по сути, является уменьшенной копией широко известной в мире бабочек Идеи Левконой (*Idea leucophaea*).

Размах крыльев
60—80 мм



Вид снизу



Бабочка *Samia Cynthia*

Цена: 1200руб.

Вид сверху



Вид снизу

Размах крыльев
90—140 мм

Samia cynthia (лат.) — вид павлиноглазок из подсемейства Arsenurinae. Гусеницы используются человеком для получения шёлка, но не является одомашненным видом, как тутовый шелкопряд (*Bombyx mori*).

В литературе конца XIX — начала XX века данный вид называли айлантовый шелкопряд, хотя к семейству шелкопрядовых данный вид отношения не имеет, несмотря на то, что даёт грубый шёлк.

Samia cynthia (лат.) - вид павлиноглазок из подсемейства Arsenurinae. Гусеницы используются человеком для получения шёлка, но не является одомашненным видом, как тутовый шелкопряд (*Bombyx mori*). В литературе конца XIX — начала XX века данный вид называли айлантовый шелкопряд, хотя к семейству шелкопрядовых данный вид отношения не имеет, несмотря на то, что даёт грубый шёлк.

Ареал на территории Европы. Распространён в Китае, Индии, Малайзии, Индокитае, на о. Ява, в Японии, на Филиппинских островах и в Европе. В Европу был изначально завезён для производства шелка, которое оказалось слишком дорогим, но несколько бабочек улетели из неволи и образовали популяции в отдельных европейских городах, таких как Вена, Париж, Страсбург, где айлант выращивался как декоративное растение.

Размах крыльев от 90 до 140 мм. Крылья имеет оливково-коричневый окрас, со светлыми полулунными пятнами в центре и широкой четырехцветной полосой (чёрной, белой, розовой и розовато-белой). Верхняя сторона брюшка желтовато-серая.

Самка откладывает яйца кучками (по 10 - 20 штук) на листья кормовых растений. Инкубация длится 7—10 дней. Гусеницы в начальной стадии живут стайками, имеют жёлтый цвет. Гусеница длиной 7—8 см. Затем гусеницы становятся одиночками и приобретают зеленоватый цвет. Перед окукливанием плетёт серо-золотистый кокон, который при разматывании даёт 600 м нити, годной для изготовления ткани. Зимует куколка. м нити, годной для изготовления ткани. Зимует куколка.

Бабочка Caligo Atreus


Цена: 1700руб.

Вид сверху

Размах крыльев
140—180 мм



Вид снизу




Caligo atreus — Калиго Атрей. Калиго в переводе с латыни «мрачный». Однако подвид Атрей Украшен далеко не мрачно. Нижняя сторона крыльев имеет характерную для всего рода Калиго окраску. Сложный узор коричнево-бурого цвета с полосами более светлыми, иногда даже оранжевыми, и обязательно на нижних крыльях два больших пятна, напоминающих совиные глаза. Такие «глаза» могут отпугивать атакующего хищника или отвлекать его внимание от жизненно важных частей тела бабочки. Верхняя сторона крыльев более цветастая. Верхние крылья темные с сине-фиолетовым отливом, нижние имеют яркую желтую полосу.


Как правило самки более крупные, чем самцы. Бабочки обитают в тропических густых лесах и днём скрываются в тени. Бабочки очень активны лишь около полудня в утренних и вечерних сумерках. Очень красивый танец ухаживания самца за самкой, когда бабочки кружатся друг вокруг друга. Ареал обитания *Caligo Atreus* Коста Рика, Аргентина, Перу, Эквадор, Мексика. Бабочка откладывает яйца на различные растения семейства банановых. Гусеницы живут по несколько особей на одном листе, активно питаются в ночное время, а днем маскируются, располагаясь вдоль главной жилки листа. Несколько гусениц Калиго вполне могут скушать все листья у 5-тилетней пальмы и часто наносят огромный урон банановым плантациям. В стадии куколки Калиго Атрей находится около месяца. Продолжительность жизни имаго 2-3 недели. Полёт бабочек быстрый размашистый и весьма хаотичный. Для салютов годится, только если в коробке вместе с калиго используются только крупные бабочки (морфо, троедесы), мелкие бабочки могут быть раздавлены столь мощным соседом. Великолепная бабочка для штучных заказов в «живой открытке». *Caligo atreus* питается соком перезревших фруктов (бананов, апельсинов, ананасов) при этом бабочка находит пищу сама даже в домашних условиях, в то время как другие бабочки надо тыкать носом в нектар. На лапках бабочки находятся вкусовые рецепторы и присев на влажную сладкую поверхность фрукта бабочка расправляет хоботок и начинает жадно пить. Трапеза может длиться до 10 минут. В парках и на выставках бабочек Калиго Атреус является желанным гостем. Правда доступна эта бабочка лишь несколько месяцев в году.

Бабочка Caligo Eurilochus

Цена: 1600руб.



Вид сверху



Размах крыльев
достигает 170 мм



Caligo Eurilochus — русское название Калиго Эврилокус — мощная крупная бабочка.

Внутри темносерая с фиолетовым отливом, если смотреть под определенным углом. Обратная же сторона крыльев у всех представителей семейства совков имеет 2 крупных пятна, похожих на совиные глаза, отсюда и название семейства — совки. Caligo Eurilochus как и все совки активная в сумеречное время. Размер бабочки достигает 17 см.

Гусеницы питаются листьями банана и являются серьезными вредителями банановых плантаций в природе, так как несколько прожорливых гусениц Калиго и вполне могут съесть 5-летнюю банановую пальму до корочки за 2 недели. В стадии куколки бабочка находится около месяца

Очень эффектна для Садов бабочек, т.к. довольна активная — самцы этого вида охраняют свою территорию и стремглав кидаются на любую пролетающую мимо бабочку. Также очень красив танец ухаживания самца за самкой, когда пара кружится в воздухе долгое время хаотично летая по всему саду. У этой бабочки крупный хоботок и она им отчетливо всасывает нектар. Именно из-за этого именно ее снимают на видео во время кормления на выставке. Эта бабочка прекрасный летун, однако она столь мощно толкается крыльями, что для фейерверков рекомендуется ее использовать лишь с крупными бабочками, если использовать и мелких бабочек, то последствия от взмаха крыльев калиго для них могут быть печальными. Ареал обитания Калиго Эврилокус — центральная Америка (Перу, Коста-Рика, Эквадор). Продолжительность жизни имаго две-три недели.


Бабочка Caligo Мемнон

Цена: 1600руб.

Вид сверху



Вид снизу



Caligo Мемнон – Калиго Мемнон. Ареал обитания: Мексика, Коста Рика, Перу, Эквадор. Сверху внутренняя часть передних крыльев желтоватая, края крыльев темно коричневые. Обратная же сторона крыльев у всех представителей семейства Калиго имеет 2 крупных пятна, похожих на совиные глаза, отсюда и название семейства – совки. Размах крыльев 14-16см. Бабочка Caligo Мемнон активна в вечернее время суток, в основном летает в сумерках. Гусеницы этого вида очень прожорливые и в конечной стадии достигают 130 мм, Калиго мемнон являются активными вредителями банановых плантаций в природе. Гусеницы при опасности выделяют капли жидкости, которые имеют отпугивающий для многих хищников запах. Гусеница развивается 35-40дне. Стадия куколки длится около месяца. Имаго кормятся соком перезревших плодов и пометом птиц. Продолжительность жизни имаго 2-3 недели. Имаго Caligo Мемнон имеет мощные крылья, за счет них бабочка мощно толкается об воздух. Имеет размашистый хаотичный полет и является прекрасным летуном, поэтому бабочка является частым гостем парков и выставок бабочек.

Для салютов из бабочек ее лучше не использовать, так как в одной коробке с мелкими бабочками она может сильно повредить соседей взмахом своих мощных крыльев. Великолепно подходит для штучных подарков с бабочками и живых открыток.

Размах крыльев
140—160 мм




Бабочка Morpho Peleides

Цена: 1700руб.



Вид сверху

Размах крыльев
120—160 мм



Вид снизу

Morpho peleides – Мофида Пелеида. Размах крыльев от 12 до 16 см. Очень яркая бабочка и самая распространенная и наиболее неприхотливая из семейства Морфид. Отличительной особенностью многих Морфид является очень красивая синяя окраска с металлическим отблеском на верхней стороне крыльев. Нижняя сторона крыльев украшена полосками и разводами с несколькими парами глазков различного размера и имеет в основном коричневый цвет.

Ареал обитания morpho peleides — страны Южной и центральной Америки — Перу, Бразилия, Коста Рика, Эквадор, Колумбия. Морфиды, несомненно, одни из самых красивых бабочек в мире. Во время полёта их крылья переливаются металлическим блеском и цвет меняется в зависимости от угла падения света от нежно голубого до тёмно-сине-зелёного. Чешуйки, покрывающие крылышки, собирают и отражают голубой свет, поэтому для человеческого взгляда они кажутся голубыми. Своей яркой окраской бабочка привлекает противоположный пол, сбивает с толку хищников и запугивает соперников. Это уникальная особенность их защитной окраски. Морфы имеют всего 4 лапы а не 6 как большинство бабочек, т.к. передняя пара лапок в процессе эволюции практически исчезла. После вылупления гусеница съедает оболочку яйца. Гусеницы бурого цвета с желтоватыми пятнами, покрыты мягким ворсом. На последних стадиях гусеница становится ярко зеленой. В стадии куколки морфо пелеидес находится 3 недели. Имаго живет в среднем 2-3 недели, при этом на протяжении всей жизни бабочка активно летает. Великолепные летуны и нередко в парках бабочек именно морфы устраивают игру в чехорду, гоняясь друг за другом носясь по всей территории. Бабочка морфо великолепно подходит и для штучных и для массовых выпусков. Голубой насыщенный цвет привлекает многих коллекционеров, также из ее крыльев делают украшения и бижутерию, а также циферблаты для дорогих швейцарских часов.

Бабочка *Argema Mimosae*

Цена: 2000руб.



Вид снизу

Вид сверху



Размах крыльев
100—140 мм

Argema mimosae — ночная бабочка из монотипичного рода *Argema* в семействе павлиноглазок (Saturniidae). Размах крыльев 100—140 мм. Самки крупнее и массивнее самцов.

Окраска крыльев ярко-жёлтая. На каждом крыле по одному крупному «глазку» коричневого цвета, с чёрной точкой в центре. Вершины крыльев с буро-чёрным пятном. По латеральному краю нижнего крыла проходит узкая серо-чёрная кайма. По крыльям проходит красновато-коричневый волнистый узор. Нижние крылья с длинными хвостиками. Усики самца крупные, перистые. У самки передние крылья шире и более округлые. Хвостики на задних крыльях короче и шире, чем у самцов. Брюшко самки крупное, бочкообразное. Ротовые органы редуцированы, бабочки не питаются и живут за счёт питательных веществ накопленных в стадии гусеницы.

Ареал обитания Центральная и Южная Африка, северная граница ареала проходит через Кению. Зимбабве, Заир, Танзания, Замбия, Малави.




Бабочка Препона Demorhoon

Цена: 1800руб.

Вид сверху



Вид снизу



Препона (Archeoprepona Demorhoon). Бабочка с радужными глазами.. Она обитает в Центральной Америке, в Эквадоре, Перу, Колумбии. Размер - около 10 см. Голубые полосы на её крыльях, подобно крыльям Голубого Морфо, переливаются разными оттенками голубого и изумрудного цвета в зависимости от угла падения солнечного света.

Препона отличается довольно резкими движениями и быстрым полётом, а во время питания и отдыха практически всегда сидит со сложенными крылышками. Поэтому чтобы разглядеть её красоту нужно иметь большое терпение и дожидаться момента, когда Препона ненадолго откроет свои крылышки.

В питании предпочитает переспевшие фрукты, свежий фруктовый сок, а также откровенно гниющие плоды и даже навоз. Кстати для бабочек с подобными вкусовыми пристрастиями очень характерен красный цвет хоботка, который мы отчётливо наблюдаем и у нашей героини.

Размах крыльев
80—100 мм



Как ухаживать за бабочками?

Полезные советы

В домашних условиях бабочку необходимо кормить 1—2 раза в день и иногда опрыскивать чистой водой комнатной температуры из опрыскивателя для цветов на расстоянии 10—15 см от крылышек.

Нормальная температура для бабочки 23—30 °С. Бабочка может жить и при меньших температурах, даже до +16 °С, но при этом она будет сонной и неактивной. При повышении температуры она опять придет в норму.

Так как бабочка всегда летит на свет, она будет стремиться к окну, особенно в солнечную погоду, и к источникам света. В связи с этим следует соблюдать следующие несложные правила:

- 1) Закройте окна в комнате, где живет бабочка.
- 2) Задвиньте тюль, чтобы бабочка не билась об стекло (это сэкономит крылышки).
- 3) Если в комнате есть люстра с плафонами в виде чаши, повернутой вверх, — не включайте ее! бабочка может погибнуть, залетев туда.
- 4) Берегите бабочку от домашних животных! На ночь бабочку можно усаживать в коробку с кусочком влажной ткани внутри, либо оставить спать на стене или занавеске.

Нельзя брать бабочек за крылья! Вы можете случайно повредить нежные крылышки или стереть с них цветную пыльцу. Проще и удобнее поднести под сидящую бабочку палец. Его надо подносить аккуратно со стороны головы насекомого и осторожно подталкивать им бабочку, побуждая ее переступить лапками. Бабочка, в конце концов, пересядет на Вашу руку. Так же можно использовать ватную палочку, смоченную в нектаре — бабочка с удовольствием заберется на нее.

В домашних условиях приготовить нектар очень легко: необходимо растворить одну чайную ложку меда (сладкого, ароматного и желательно без консервантов) в 10—15 чайных

ложках воды. Мед можно заменить сахаром (1 чайная ложка). Раствор меда для кормления лучше готовить на один раз, так как он быстро прокисает. Затем этим раствором пропитать чистую губку (ватный спонжик) и усадить на нее бабочку. Также можно перелить раствор меда в крышечку, посадить бабочку рядом и размотать ей хоботок зубочисткой макнув его в раствор. Если Ваша красавица голодна, она сразу же расправит свой хоботок и начнет кушать свое лакомство. Вкусовые рецепторы находятся у бабочки на концах передних ножек: иногда для того, чтобы она начала активно искать пищу, ей достаточно коснуться нектара передней лапкой. Попавший в раствор меда хоботок бабочки начинает выразительно двигаться. Обычно хватает несколько минут, чтобы бабочка насытилась. Не следует держать насекомое в руках во время кормления.

• Многие бабочки не откажутся и от сочных фруктов, таких как апельсины, арбузы, манго или подгнившие (почерневшие) бананы.

• Бабочку нужно держать подальше от химикатов, моющих средств, растворителей, горюче-смазочных материалов, а также не давать брать их в рот маленьким детям и домашним животным.

Однако основной причиной сокращения продолжительности жизни домашних бабочек является не столько неполноценное кормление, сколько недостаточная влажность. Уровень влажности их обычного места обитания в тропиках намного выше чем в наших квартирах. В сухом воздухе крылышки, усики и лапки бабочек становятся ломкими. Поэтому Вашу красавицу необходимо 1—2 раза в день опрыскивать кипяченой холодной водой, для этого используется распылитель, 1—3 пшика. На ночь поместите бабочку в просторную коробку, на дно коробки уложите влажную губку, полотенце или смоченный в воде пласт ваты — повышенная влажность позволит продлить жизнь бабочки в домашних условиях. Оставьте коробку с бабочкой в прохладном месте. Утром разбудите «нежный цветок», открыв коробку и переставив ее в более теплое место.



www.tropicheskie-babochki.rf

Тел.: 8 (909) 444-222-0, 8 (928) 261-24-24

E-mail: tropiceskie@mail.ru

Отравим фото по: Viber, WhatsApp

**ЗАКАЗ ВАМ ДОСТАВЯТ НА ДОМ ИЛИ
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕГО В ПУНКТЕ ЗАКАЗА**